

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

29.02.2016

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Линковик для лечения животных  
при бактериальных инфекциях

(организация-разработчик ООО «ВИК – здоровье животных»,  
Россия, 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково,  
Егорьевское шоссе, д. 3А)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Линковик (Linkovic).  
Международное непатентованное наименование: линкомицин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Линковик содержит в 1 мл в качестве действующего вещества 100 мг линкомицина в форме гидрохлорида, а в качестве вспомогательных веществ бензиловый спирт и воду для инъекций.

3. По внешнему виду Линковик представляет собой бесцветный прозрачный раствор.

Срок годности Линковица при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять Линковик по истечении срока годности.

4. Линковик выпускают расфасованным по 10, 50 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы объемом 10 мл упаковывают по 10 штук в коробки из картона. Каждая потребительская упаковка препарата сопровождается инструкцией по применению.

5. Линковик хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Линковик следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Линковик – антибактериальный лекарственный препарат группы линкозамидов.

10. Линкомицина гидрохлорид является представителем класса пиранозидов-4-алкил замещенных гиграновой кислоты. Антибиотик обладает бактериостатическим действием в отношении преимущественно грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus* spp. (в том числе, продуцирующих пенициллиназу), *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Campylobacter* spp., *Actinomyces* spp., *Clostridium perfringens*, *Clostridium tetani*, *Leptospira pomona*, *Bacteroides* spp., *Bacillus* spp., а также в отношении *Fusobacterium* spp., *Treponema hyodysenteriae* и *Mycoplasma* spp.

Механизм действия линкомицина заключается в ингибировании сбора пептидных цепочек на уровне 50S субъединицы рибосом, что приводит к нарушению синтеза белка и гибели бактериальной клетки.

При парентеральном введении линкомицин быстро всасывается из места инъекции и проникает во все органы и ткани организма животных, в том числе и в костную ткань. Максимальная концентрация антибиотика в крови достигается через 20-40 минут после введения и сохраняется на протяжении 3-6 часов, а терапевтическая концентрация – в течение 24 часов.

Линкомицин не подвергается биотрансформации в организме животных и выделяется преимущественно в неизменном виде с мочой и желчью.

Линковик по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Линковик применяют для лечения энзоотической пневмонии и дизентерии свиней, респираторных заболеваний, актиномикозов, остеомиелитов и других заболеваний животных, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами.

12. Линковик противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности животного к линкомицину, а также при тяжелых нарушениях функции печени и почек. Не допускается применение Линковика животным с рубцовым пищеварением в возрасте старше 6 месяцев.

13. Линковик применяют один раз в сутки в следующих дозах:  
свиньям – внутримышечно 0,1 мл/кг массы животного в течение 3-7 дней;  
телятам – внутримышечно 0,1 мл/кг массы животного в течение 2-4 дней;  
собакам и кошкам – внутримышечно 0,2 мл/кг массы животного или внутривенно 0,1 мл/кг массы животного в течение 3-7 дней.

14. Симптомы передозировки лекарственного препарата не установлены.

15. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

16. Линковик противопоказан беременным и лактирующим животным.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.



18. Побочных явлений и осложнений при применении Линковика в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства.

19. Не допускается одновременное применение Линковика с макролидами и хлорамфениколом.

20. Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 3 суток после последнего введения Линковика. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Линковином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки с мылом. Людям с гиперчувствительностью к линкомицину следует избегать прямого контакта с Линковином.

23. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата

Иностранное унитарное предприятие «ВИК – здоровье животных», Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 29.

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140051, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Линковика, утвержденная Россельхознадзором 23 мая 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-12.12-3034 НЛПР.3-7.6/02062